

ARAŞTIRMA RESEARCH

Ergenlerde Premenstrüel Sendrom ile Ruh Sağlığı Değişkenleri Arasındaki İlişki

The Relationship Between Premenstrual Syndrome and Mental Health Variables in Adolescents

Gülgün Uzunoglu¹ , Zekeriya Deniz Aktan¹ 

Öz

Premenstrüel sendrom, 15-18 yaşlar arasındaki genç kızların sıklıkla karşılaştığı psikolojik ve fizyolojik bir rahatsızlıktır. Bu çalışmanın amacı premenstrüel sendromun yaşam kalitesi, öfke ve depresyon düzeyi ile ilişkisinin araştırılmasıdır. 156 kız lise öğrencisinin katılımı ile mevcut okul ortamında yapılan çalışmada, Sosyodemografik Form, Premenstrüel Sendromu Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre premenstrüel sendromu düzeyi arttıkça, depresyon ve öfke düzeyi anlamlı olarak artmakta ancak yaşam kalitesi düşmektedir. Ayrıca yaşam kalitesi ve premenstrüel sendromu arasındaki ilişki depresyonun ve öfkenin kısmi aracı etkisi ayrı ayrı değerlendirildiğinde anlamlı bulunmuştur. Depresyon ile premenstrüel sendromu bağlantısında öfkenin bağıntı üzerinde anlamlı bir kısmi aracı etkisi olduğu görülmüştür. Sonuç olarak premenstrüel sendromu olan bireylerin tedavisinde, öncelikle depresyon, öfke ve yaşam kalitesi boyutlarının kontrol edilmesi ve söz konusu değişkenler arası ilişkiler gözardı edilmemelidir.

Anahtar sözcükler: Premenstrüel sendromu, depresyon, yaşam kalitesi, öfke.

Abstract

Premenstrual syndrome is a frequently encountered psychological and physiological disorder in adolescents between 15 and 18 years of age. The aim of this study is to analyze the relationship of premenstrual syndrome with quality of life, level of anger and depression. One hundred fifty six female high school students were recruited for the study. All completed sociodemographic form, Premenstrual Syndrome Scale, Beck Depression Inventory, Quality of Life Scale for Children (Adolescent Form) and The State-Trait Anger Expression Inventory. Results indicated that whilst the severity of premenstrual syndrome increases, depression and level of anger significantly increase, however, quality of life decreases. The partial mediation effect of depression and anger on the relationship between quality of life and premenstrual syndrome were found to be significant when examined separately. Moreover, anger had a significant partial mediation effect on the relationship between depression and premenstrual syndrome. In conclusion, in the treatment of individuals with premenstrual syndrome, the dimensions of depression, anger and quality of life should be controlled first and the relationships between these variables should not be ignored.

Keywords: Premenstrual syndrome, depression, quality of life, anger.

¹ Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Bölümü, İstanbul

✉ Gülgün Uzunoglu, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Bölümü, İstanbul, Turkey
gulgunuzunoglu@gmail.com

Geliş tarihi/Submission date: 03.02.2019 | Kabul tarihi/Accepted: 05.04.2019 | Çevrimiçi yayın/Online published: 21.05.2019

GEÇMİŐTEN günümüze, kadınlar ile erkekler arasındaki farklar çeşitli yönlerden bilim dünyasına sıklıkla araştırma konusu edilmiştir (Ridgeway ve Smith-Lovin 1999, Sloan 2012, Tuđlu 2013, Arenliu ve ark. 2016). Bir yandan, bu iki tür hem fizyolojik ve psikolojik yönden hem de davranışsal ve duygusal alanda farklılık gösterirken, en belirgin şekliyle kadınların doğurganlığa sahip olmaları yönüyle birbirinden ayrılmaktadır (West ve Zimmerman 1987). Adet görme ile başlayan kadının doğurganlık dönemi, hamilelik ve sonrası dönemi takiben, menopoz ile tamamlanır ve bu gibi evreler arasındaki geçişler kadınların hem bedenlerinin hem de duygularının olumsuz etkilenmelerine sebep olup, duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşayabilecekleri dönemlerdir. Bunun dışında, büyümek ve klanmak anlamındaki Latince kökenli ve bireyin sosyal, biyolojik ve psikolojik birçok alanda hızlı deđişimlere uğradığı bir yaşam aşaması olan ergenlikle ve ergenliğin getirdiđi hızlı deđişimlerle baş edilememesi halinde (Hamburg ve Takanishi 1989, Derman ve ark. 2004), genç kızların özellikle ruh sađlığı olumsuz etkilenebilmektedir.

Diđer yandan, ergenlikle birlikte adet görmeye başlayan genç kızlar, adet dönemi ve öncesinde de bedensel veya duygusal zorluklar yaşayabilmektedir. Adet döneminde karşılaşılan güçlükler düzensiz ve sancılı adet görme gibi rahatsızlıklar ile gözlenirken, adet öncesi dönemde karşılaşılan fiziksel, davranışsal veya zihinsel yaşanan güçlükler belirginleştii ve süreklilik gösterdiđi takdirde premenstrüel sendromu (PMS) ile ortaya çıkmaktadır (Derman ve ark. 2004). Çeşitli belirtiler (duygusal, bedensel) ile her adet görme dönemi öncesinde olmak ve adet kanamasının başlamasını takip eden bir haftalık dönemde belirti göstermemek şartıyla ortaya çıkan PMS, ergenliğin etkilediđi ruh sađlığı deđişkenleri ile bir araya geldiđinde, genç kızlar için baş etmesi güç hale gelebilmektedir (Choate 2014). Bu sebeple, ileride önlenemez sorunlara yol açmaması ve genç kızların yetişkinliklerindeki ruh sađlıklarında ve bedenlerinde kalıcı izler bırakmaması için PMS düzeyi ile ruh sađlığı deđişkenleri olan yaşam kalitesi, depresyon ve öfke düzeylerinin ilişkisinin incelenmesinin önemli olacağı düşünülmektedir.

PMS ile ruh sađlığı deđişkenlerinin ilişkisine odaklanan çok sayıda çalışma mevcuttur (Ugarrizza ve ark. 1998, Franckiewicz ve ark. 2001, Bosarge 2003, Öncel ve Pinar 2006, Tanrıverdi ve ark. 2010, Kırcan ve ark. 2012, American Psychiatric Association 2013, Schmelzer ve ark. 2015, Arslantaş ve ark. 2018). PMS ile ruh sađlığı arasındaki olası ilişkiyi inceleyen bu çalışmalar, ruh sađlığı deđişkenleri arasındaki etkileşimleri göz ardı etmiş ve her bir deđişkenin tek tek PMS üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Başka bir deyişle, PMS ile ruh sađlığı deđişkenlerinin ilişkisine bütüncül açıdan yaklaşan sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Tüm bu veriler ışığında bu araştırmanın ilk adımında öncelikle PMS ile ruh sađlığı deđişkenleri olan yaşam kalitesi, depresyon ve öfke kavramları arasındaki ilişkiler açıklanacak ve günümüz literatüründe söz konusu ilişkilere dair yapılan araştırmalar özetlenecektir.

Adet görme, ergenliğe geçiş ile birlikte, sađlıklı gelişim gösteren kadınların hayatında yerini almaya başlayan, menopoz dönemine kadar sürekliliđi olan ve kadınlarda doğurganlığı sađlayan aşamalardan biridir. Her ay yenilenen ve kadınlarda psikolojik ve bedensel olarak deđişim yaşanmasına neden olan ve üreme için gerekli olan adet dönemlerinde, sancılı adet görme, adet düzensizliđi, kanama bozukluđu gibi rahatsızlıklar karşılaşılan rahatsızlıklardan bazılarıdır. Adet öncesi dönemde ise sıklıkla karşılaşılan problemlerin başında PMS gelmektedir (Evliyaođlu ve ark. 2010). PMS, adet kanamasından önceki 7-14 gün arasındaki dönemde, kişiden kişiye şiddeti ve belirtileri yönüyle

farklılaşarak, fiziksel, davranışsal veya duygudurum değışimleri ile kendini gösteren ve adet kanamalarının başlaması ile etkinliğini yitiren psikonöroendokrin bozukluktur (Logue ve Moos 1986, Dođan ve ark. 2012). İlk kez Frank tarafından “premenstrüel gerginlik” adıyla tanımlanmış ve adetten önceki 7 ile 10 gün arasındaki süreçte şiddetli gerginlik, kilo alımı, baş ağrısı ve ödem olması ile nitelendirilmiştir (1931). PMS düzeyi ölçeklerle ve klinik incelemeler ile belirlenerek, adet öncesi gerginliđin seviyesinin belirlenmesi hedeflenir. Ancak, çođu kadın PMS belirtileri gösterdiği halde, belirtileri izlenerek tanısı konulan kadın sayısı oldukça az olmaktadır. Kadınların yaklaşık %40’ı hafif ve orta düzeyde, %2-10 arasında PMS’i şiddetli düzeyde tecrübe ettiği görülmüştür (Logue ve Moos 1986).

PMS ile seyreden davranışsal ve psikolojik değışimler, bireyin değışimlerinin düzeyine ve bireyin toleransına göre insanın ruh sađlığı üzerinde problem oluşturabilmektedir. Tanımlanan bazı davranışsal ve psikolojik problemler şunlardır; yalnızlık hissi, unutkanlık, konsantrasyonda azalma, kafa karışıklığı, huzursuzluk ve endişe hali, beklenmeyen ağlamalar, özellikle belirli yiyeceklere karşı aşırı yeme isteđi ve iştahın artması, cinsel istekte değışim, öz saygının azalması ve değersizlik hissini takip etmesi, yorgunluk hali ve aşırı uyuma isteđi ya da uykusuzluktur. En önemli ve sıklıkla raporlanan problemlerin başında ise depresif düşünceler ve ruh hali sergileme, kızgınlık/öfke halinde olma ve asabilik olduğu görülmektedir (Ugarrizza ve ark. 1998, Franckiewicz ve ark. 2001, Bosarge 2003, Öncel ve Pınar 2006, Tanrıverdi ve ark. 2010, Kırcan ve ark. 2012, American Psychiatric Association 2013, Schmelzer ve ark. 2015, Arslantaş ve ark. 2018).

PMS’ye en fazla eşlik eden ruh sađlığı problemlerinin başında depresyon, yaşam kalitesi ve öfke kontrol problemleri gelmektedir. Lutsky ve arkadaşları (2004) 18 ile 33 yaşlarındaki kadınlara odaklandıkları önceki çalışmalarında PMS düzeyleri/belirtileri ile stres ve yaşam kalitesinin ilişkisi araştırılmıştır. PMS’i düşük olan kişinin yaşam kalitesi genel düzeyi, PMS’i yüksek olan kişilerin yaşam kalitesi genel düzeylerine kıyasla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Diğer yandan, PMS’nin depresyon ile ilişkisini inceleyen birçok çalışmada depresyon düzeyi ile PMS düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (Gözüm ve ark. 1996, Erci ve ark. 1999, Danacı ve ark. 2001, Akdeniz ve ark. 2002, Korkmaz ve ark. 2005, Yücel ve ark. 2009). Literatürden elde edilen bir diğer veri, PMS olan bireylerde psikolojik boyutlu belirt alanında öfkelenme ve sinirlilik PMS ile birlikte sık görüldüğü yönündedir (Ugarrizza ve ark. 1998, Franckiewicz ve ark. 2001, Bosarge 2003, Öncel ve Pınar 2006, Tanrıverdi ve ark. 2010, Schmelzer ve ark. 2015).

Bu çalışmanın amacı ruh sađlığı değışkenleri olan yaşam kalitesi, öfke ve depresyonun PMS ile ilişkisini incelemek ve aynı zamanda ruh sađlığı değışkenlerinin kendi aralarındaki ilişkilere ve bu ilişkilerle birliktaki PMS ile olan etkisini değerlendirmektir.

Yöntem

Örnekleme

Araştırmanın etik açıdan uygun olduğuna ve yapılabileceğine dair Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik Kurulundan 28.11.2017 tarihinde onay verilmiştir. Ayrıca araştırmanın örnekleme liselerden ulaşılacağı için de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 26.01.2017 tarihinde gerekli izinler alınmıştır. İzinlerden sonra, araş-

tırmanın katılımcıları kolay ulařılabilir örneklem yoluyla belirlenmiř ve İstanbul'daki iki lise seçilmiřtir. Liselerin yetkililerinden de izin alındıktan sonra arařtırmaya bařlanmıřtır.

Arařtırma örneklemini henüz 18 yařını doldurmamıř bireyler oluřturduđundan, ilk olarak katılımcıların ebeveynlerinden "Veli Bilgilendirme ve Onay Formu" ile arařtırma katılımlarına dair izin alınmıřtır. Velinin onay vermiř olduđu katılımcıların, arařtırmaya gönüllü katıldıklarına dair "Bilgilendirilmiř Gönüllü Olur Formu" ile rızası alınmıř ve sonrasında arařtırma ölçekleri katılımcılara řubat 2017 tarihinde uygulanmıřtır. Ölçek sorularını cevaplandırırken katılımcıların kendilerini rahat hissetmeleri için, sadece kız öđrencilerin bulunduđu kütüphane ve kız yurdunda uygulamanın yapılması tercih edilmiřtir (uygulama yarım saat sürmüřtür). Katılımcılardan soruları cevaplandırmaları istenmiřtir. Yönergeler yazılı ve sözlü olarak verilmiřtir.

Katılımcıların, 15 yař 0 ay ile 18 yař 12 ay arasında olması arařtırmanın tek ileme kriteridir ve arařtırma için herhangi bir dıřlama kriteri belirlenmemiřtir. 158 öđrenci arařtırmaya katılmıřtır ancak 2 katılımcının yařı hedeflenen katılımcı yařından düřük olduđu için alıřmaya dahil edilmemiřlerdir ve alıřma 156 gen kız ile tamamlanmıřtır (n=156). Katılımcıların ortalama yařı 16.28, ilk adet görme yařları ortalaması 12.66 ve adet görme süresi ise 5.71 yıldır.

Veri Toplama Araları

Uygulanan arařtırma ölçekleri Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu, PMS Öleđi, Beck Depresyon Envanteri, ocuklar İçin Yařam Kalitesi Öleđi (Ergen Formu) ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Öleđi'dir.

Sosyodemografik Özellikler ve Veri Formu

Arařtırmacı tarafından, katılımcıların sosyodemografik özelliklerine eriřmek ve adet düzenleri ile ilgili bilgi almak üzere hazırlanan veri formudur. Formda katılımcıların yařı, sınıfı, anne eđitimi, baba eđitimi, annenin alıřma durumu, babanın alıřma durumu, katılımcının okul bařarısı, ilgilendiđi aktivitenin olup olmaması, ilk adet görme yařı, adet süresinin uzunluđu, adet düzeni, adet hakkında anne ile konuřabilme ve adet üzerine tedavi görüp görmemesi konularına dair soruları cevaplamaları beklenmektedir. Ancak bu alıřma geniř bir arařtırmayı kapsadıđı için Sosyodemografik Form'daki deđiřkenler ile ruh sađlıđı ve PMS deđiřkenleri ile ilgili yapılan analizlerin ilerleyen bir alıřmada detaylıca incelenmesi hedeflenmektedir.

Premenstrüel Sendrom Öleđi

PMS düzeyini ve belirtilerini ölçmek için 2006 yılında Gençdođan tarafından geliřtirilen ve güvenilirliđi yapılan Premenstrual Sendrom Öleđi kullanılmıřtır. 5 seviyeden oluřan (Hi, ok az, Bazen, Sık sık, Sürekli) likert tipi bir ölektir ve 44 maddeden oluřmaktadır. Adetten bir hafta önceki süre içinde olma durumu düřünülererek katılımcılardan soruları cevaplamaları istenmektedir.

Öleđi deđerlendirirken, "Hi" yanıtı 1 puan, "ok az" yanıtı 2 puan, "Bazen" yanıtı 3 puan, "Sık sık" yanıtı 4 puan ve "Sürekli" yanıtı 5 puan olarak alınır. Ölekten alınabilecek en düřük puan 44, en yüksek puan ise 220'dir. Ölekten elde edilen puanlar ne kadar yüksekse, PMS belirtilerinin de o kadar yüksek olacađı řeklinde yorumlanabilir. Gençdođan'ın öleđi geliřtirdiđi arařtırmasının güvenilirlik analizinde, Cronbach alfa katsayısı 0.75 olarak bulunmuřtur(2006). Arařtırmamızdaki güvenilirlik analizine göre ise Cronbach alfa katsayısı 0.95 olarak belirlenmiřtir.

Beck Depresyon Envanteri

Öz-değerlendirme yapılarak, depresyon varlığı ve düzeyini belirlemek üzere oluşturulan ölçek, 13 yaş ve üzerindeki örneklem ile, Beck ve arkadaşları tarafından 1961 yılında geliştirilmiş ve 1978 ile 1996 yıllarında revize edilmiştir (Beck ve ark. 1988). Ölçeğin, ülkemizde Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması ise 1989 yılında Hisli tarafından, 17-23 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri ile yapılmıştır. Bireyin kendinde algıladığı depresif düşünceleri, öznel olarak inceleyen ölçek 21 sorudan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 63'tür. Beck tarafından yapılan geçerlik güvenilirlik çalışmaları sonucunda iç tutarlılık katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur (1978). Hisli'nin (1989) yapmış olduğu, Türkçe güvenilirlik araştırmasına göre, ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0.80'dir. Yapılan bu çalışmada ise ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.81 olarak raporlanmıştır.

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (Ergen Formu)

Yaşam kalitesi ölçeği, Varni ve arkadaşları tarafından, ilk olarak 1999 yılında kanser hasta örneklemini ile geliştirilmiştir. 2001 yılında, yine Varni ve arkadaşları tarafından sağlıklı 2-18 yaş arasındaki çocuklar ve ergenler için yeniden düzenlenmiştir. Beşli likert tipi ölçeğin Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışması ise Memik ve arkadaşları tarafından 13-18 yaş ergenleri için 2007 yılında yapılmıştır. Yaşam kalitesi toplam skoru hesaplanabildiği gibi duygusal, sosyal, fiziksel ve okul işlevselliği, yaşam kalitesi ölçeği alt dalı olarak incelenebilmektedir. Ölçekten alınan toplam puanlar, ölçek soruları olumsuz yapıda oluşturulduğu için, alınan puan yükseldikçe, yaşam kalitesinin o seviyede düşük olacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Varni ve arkadaşlarının (2001) yapmış olduğu araştırmanın toplam skor için iç tutarlılığı 0.88 olarak saptanmıştır. Memik ve arkadaşları (2007) tarafından 13-18 yaşları arasındaki ergenler ile Türkçe geçerlik ve güvenilirliği yapılan ölçeğin toplam puanı için iç tutarlılığın 0.83 olduğu görülmüştür. Yapılan bu araştırmanın sonucunda ise toplam puan cronbach alpha katsayısı 0.82 olarak bulunmuştur.

Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği

Öfke boyutunu ölçmeyi hedefleyen ölçek, Spielberger (1988) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması ve güvenilirlik çalışması, lise ve üniversite öğrencileri ile Özer (1994) tarafından yapılmıştır. Spielberger'in geliştirdiği ölçek 44 sorudan oluşmakta ve durumsal duygudurumlarını (durumluk öfke) ve öfkeye yatkınlığı ölçümlemeyi hedeflemiştir. Diğer yandan, ölçeğin Türkçe uyarlaması, 34 sorudan oluşmakta ve durumluk öfke boyutunu içermemektedir (Evren ve ark. 2011). Bu çalışmada öfke düzeyi incelenirken, Evren ve arkadaşlarının çalışmasında (2011) olduğu gibi toplam öfke skoru hesaplanarak işlem yapılmış ve çalışmanın öfke boyutu için iç tutarlılık Cronbach alpha katsayısı ise 0.68 bulunmuştur.

İstatistiksel Analiz

Araştırmanın istatistiksel bulguları SPSS 21.0 İstatistiksel Veri Analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde $p < 0.05$ anlamlı değer olarak kabul edilmiştir. İlk olarak, PMS ile depresyon, öfke ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin varlığı ve olan ilişkinin düzeyi ile yönünü incelemek üzere Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. İkinci adımda, PMS bağımlı değişken olarak belirlendiğinde, depresyon, öfke ve yaşam kalitesinin her birinin bir diğer değişken üzerinde mediatör (aracı) değişken etkisi yaratabileceği düşünülerek, doğrusal hiyerarşik regresyon analizi ile

mediatör etkinliđi ve anlamlılıđı incelenmiřtir. Medyatör analizinin detaylı bulguları ve yapılandırması sonuç bölümünde verilmiřtir.

Bulgular

PMS ile Depresyon, Öfke ve Yařam Kalitesi Arasındaki İliřki

15-18 yařlarındaki ergenlerin, PMS ile depresyon, öfke ve yařam kalitesi düzeyleri arasındaki iliřkileri incelemek amacıyla oluřturulan arařtırmanın ilk adımında, deđiřkenler olarak alınan PMS, depresyon, öfke ve yařam kalitesi düzeyi arasındaki muhtemel karřılıklı iliřkilere odaklanılmıřtır. Bunun üzerine, söz konusu iliřkilerin boyutlarını ve yönünü deđerlendirmek amacıyla Pearson korelasyon testi uygulanmıřtır.

Tablo 1. PMS ile öfke depresyon ve yařam kalitesi iliřkisi

	PMS	Öfke	Depresyon	Yařam kalitesi
PMS	-			
Öfke	.336*			
Depresyon	.459*	.255*	-	-
Yařam kalitesi	.568*	.225*	.419*	-


* $p < .01$. PMS: Premenstrüel sendrom.

Tablo 1'de görüldüğü üzere, PMS düzeyi ile yařam kalitesi düzeyi arasında ($r = .568$, $p = .0001$), PMS düzeyi ile depresyon düzeyi arasında ($r = .459$, $p = .0001$) ve PMS düzeyi ile öfke düzeyi arasında ($r = .336$, $p = .0001$) pozitif yönde anlamlı bir iliřki vardır. Bu durum PMS düzeyi artış gösterdikçe, depresyon ve öfke düzeyinin de artışa geçtiđi şeklinde yorumlanabilir. Ancak, PMS ve yařam kalitesi puanları arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelatif iliřki varmış gibi görünse de yařam kalitesi ölçeđinden alınan yüksek puanların, düşük yařam kalitesini temsil etmesi dolayısıyla, bu iki deđiřken arasındaki iliřkinin negatif yönde yorumlanması gerekmektedir. Diđer bir deyiřle, PMS düzeyi yükseldikçe yařam kalitesinin düřtüđü anlařılmalıdır. Ek olarak, yařam kalitesi düzeyi ile depresyon düzeyi arasında da anlamlı bir karřılıklı iliřki olduđu görülmektedir ($r = .419$, $p = .0001$). Yani, yařam kalitesi düřtükkçe, depresyon düzeyi artış göstermektedir. Depresyon ve öfke deđiřkenleri de bir diđer pozitif yönlü anlamlı iliřkiye sahip olan deđiřkenlerdir ($r = .255$, $p = .001$). Diđer bir ifadeyle, depresyon düzeyi arttıkça, öfke düzeyi de artış göstermektedir. Öfke düzeyi ile yařam kalitesi düzeyi arasındaki iliřkiye bakıldığında ise orta düzeyde anlamlı ve olumlu yönde bir korelatif iliřki saptanmıřtır ($r = .225$, $p = .005$). Tüm bu veriler, yařam kalitesinin düřmesinin öfke düzeyini arttıracadıđı şeklinde yorumlanabilir.

Mediatör Etki Analizi

Pearson korelasyon analizi sonucunda, tüm deđiřkenler arasında anlamlı iliřkiler olduđu görülmüřtür. Ek olarak, karřılıklı iliřkisine bakılan deđiřkenler arasındaki bađıntının niteliđinin ve kuvvetinin, aracı bir deđiřkenden etkilenip etkilenmediđini öğrenebilmek adına mediatör (aracı) etki analizi dođrusal hiyerarřik regresyon analizi ile yapılmıřtır. Medyatör etkinliđinin incelenmesi için, dört önemli řarta sahip olan Baron ve Kenny (1986) mediatör etki analizi yöntemi seçilmiř ve söz konusu deđiřkenler arası iliřkilere dair mediatör etki analizine geçmeden önce Baron ve Kenny'nin kriterlerinin yerine getirilip getirilmediđi tahlil edilmiřtir. Medyatör analiziyle birlikte, deđiřkenler arasındaki iliřkilerin ilk üç kriteri karřılandığı görülmüřtür. Medyatör deđiřken kontrol edil-

diğinde yordayıcı deęişkenin yordanan deęişken üzerindeki etkisinin anlamsız olması gerektiğini belirten dördüncü kriter ise hiçbir modelde karşılanmamasına rağmen, mediatör deęişken kontrol edildiğinde ruh sağlığı deęişkenleri ve PMS arasındaki ilişkinin gücünde bir azalma kaydedildiğinden kısmi mediatör etkiden bahsedilebileceği düşünülmüştür. Analiz sürecinde, ruh sağlığı deęişkenlerinin birbirleri üzerinde olan aracı deęişken etkisini incelemek için PMS'in bağımlı deęişken olarak seçilip yordanan olduğu, üç farklı model oluşturulmuştur. Bunlardan ilki, yaşam kalitesinin yordayıcı (bağımsız deęişken), PMS'in yordanan (bağımlı deęişken) ve depresyonun mediatör (aracı deęişken) olarak belirlendiği modeldir. İkincisi, yaşam kalitesinin yordayan (bağımsız deęişken), PMS'in yordanan (bağımlı deęişken) ve öfkenin mediatör (aracı deęişken) seçilerek oluşturulan modeldir. Son belirlenen model ise depresyonun yordayıcı (bağımsız deęişken), PMS'in yordanan (bağımlı deęişken) ve öfkenin yine mediatör (aracı deęişken) olarak incelendiği bir bağlamda kurulmuştur.



Şekil 1. Model 1- Yaşam kalitesi ve PMS arasındaki ilişkide depresyonun mediatör etkisi

Yaşam Kalitesi ile PMS Düzeyleri İlişkisinde Depresyonun Aracı Etkisi

Araştırmanın bu adımında, Şekil 1.'de görüldüğü üzere, yaşam kalitesinin yordayıcı, PMS'in yordanan ve depresyonun aracı (mediatör) deęişken olarak belirlendiği bir model geliştirilmiştir.

Tablo 2. Doğrusal hiyerarşik mediatör analizine göre depresyonun yaşam kalitesi ve PMS üzerindeki aracı etkisi

Model	B	β	p	F	R ²	ΔR^2
Yaşam kalitesi	1.715	0.568	0.000	73.158*	0.322	0.322
Yaşam kalitesi	1.375	0.455	0.000	47.241*	0.382	0.060
Depresyon	1.133	0.269	0.000			

* $p < .01$. B: unstandardised regression coefficient. β : standardised regression coefficient. p: p value. F: F statistic. R²: R Squared. ΔR^2 : Delta R Squared



Şekil 2. Model 2- Yaşam kalitesi ve PMS arasındaki ilişkide öfke düzeyinin mediatör etkisi

Model-1'de olduğu ve Tablo 2.'de görülebileceği gibi, yaşam kalitesi ve PMS arasındaki ilişkinin, depresyonun aracı varlığından nasıl etkilendiği incelenmiştir. Öncelikle, yaşam kalitesi ile PMS arasındaki ilişkide, yaşam kalitesinin PMS'i yordamasına odaklanıldığında, yaşam kalitesinin PMS için anlamlı bir tahmin edici olduğu ($\beta = .57$, $F(1,154) = 73.158$, $p = .00$) ve PMS'in varyansının yaklaşık %32'sinin yaşam kalitesi tarafından açıklandığı görülmüştür ($b = 1.715$, $R^2 = .32$, $p = .00$). Yordayıcı olan yaşam kalitesi ile aracı deęişken olan depresyon arasındaki ilişkiye bakılan ikinci adımında ise yaşam kalitesinin, depresyon düzeyini anlamlı olarak yordadığı ($\beta = .42$, $F(1,154) = 32.712$,

$p=.00$) ve depresyonun varyansının yaklaşık %17'sini açıkladığı bulunmuştur ($b=0.301$, $R^2=.17$, $p=.00$). Son olarak, depresyonun yaşam kalitesi ile PMS ilişkisindeki mediatör (aracı) etkisini değerlendirebilmek üzere, yaşam kalitesi ve depresyonun beraber olarak PMS üzerindeki yordayıcı etkisi incelenmiştir. Sadece depresyonun da PMS'i anlamlı olarak tahmin ettiği ($\beta=.27$, $p=.00$) ve PMS'in varyansının yaklaşık %6'sının depresyon tarafından açıklandığı anlaşılmıştır ($b=1.133$, $R^2\text{change}=.06$, $p=.00$). Diğer yandan, yaşam kalitesi ile PMS arasındaki ilişkide, aracı değişken olan depresyon kontrol edildiğinde, yaşam kalitesinin, PMS üzerindeki yordayıcı etkisinin azaldığı ($\beta=.45$, $F(2,153)=47.241$, $p=.00$) ancak anlamlılığını kaybetmediği görülmüştür ($b=1.375$, $R^2=.38$, $p=.00$). Bu azalmanın anlamlılığını incelemek amacıyla Sobel z testi yapılmış ve sonucunda, yaşam kalitesi ile PMS ilişkisi üzerinde, depresyonun anlamlı bir kısmi mediatör etkisi olduğu bulunmuştur ($z=3.18$, $p=.00$).

Yaşam Kalitesi ile PMS Düzeyleri İlişkisinde Öfkenin Aracı Etkisi

Şekil 2.'de verilen, yaşam kalitesi düzeyinin yordayıcı, PMS düzeyinin yordanan, öfkenin ise aracı değişken olarak belirlendiği modelde, yaşam kalitesi düzeyi ile PMS düzeyi arasındaki anlamlı ilişkide, öfke düzeyinin aracı değişken olup olmadığı doğrusal hiyerarşik regresyon analiziyle incelenmek istenmiştir.

Tablo 3. Doğrusal hiyerarşik mediatör analizine göre öfkenin yaşam kalitesi ve PMS üzerindeki aracı etkisi

Model	B	β	p	F	R ²	ΔR^2
Yaşam kalitesi	1.715	0.568	0.000	73.158*	0.322	0.322
Yaşam kalitesi	1.566	0.518	0.000	44.517*	0.368	0.046
Öfke	0.825	0.220	0.001			

* $p<.01$. B: unstandardised regression coefficient. β : standardised regression coefficient. p: p value. F: F statistic. R²: R Squared. ΔR^2 : Delta R Squared



Şekil 3. Model 3- Depresyon ve PMS arasındaki ilişkide öfke düzeyinin mediatör etkisi

Tablo 3'te gösterilen Model-2 bulguları ışığında, ilk olarak, yaşam kalitesi ile PMS arasındaki ilişkide, yaşam kalitesinin PMS'i ne kadar tahmin ettiğine bakılmış ve yaşam kalitesinin, PMS üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu ($\beta=.56$, $F(1,154)=73.158$, $p=.00$) ve yaşam kalitesinin PMS'i %32 oranında açıkladığı raporlanmıştır ($b=1.715$, $R^2=.32$, $p=.00$). İkinci analizde ise yaşam kalitesinin yordayıcı olarak, aracı değişken olan öfkeyi yordayıp yordamadığına bakılmış ve öfkenin yaşam kalitesi tarafından anlamlı bir şekilde tahmin edilebildiği ($\beta=.22$, $F(1,154)=8.231$, $p=.00$) ve yaşam kalitesinin öfkenin varyansını yaklaşık %5 seviyesinde açıkladığı bulunmuştur ($b=0.181$, $R^2=.05$, $p=.00$). Yaşam kalitesi ve PMS arasındaki ilişkide, öfkenin mediatör etkisini incelemek adına, son olarak, öfkenin tek başına da PMS üzerindeki yordayıcı etkisine birlikte bakıldığında, öfkenin tek başına da PMS üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu ($\beta=.22$, $p=.00$) ve yalnız %4 seviyesinde PMS'in varyansını açıkladığı ortaya çıkmıştır ($b=0.825$, $R^2\text{change}=.04$, $p=.00$). Ayrıca, öfkenin yaşam kalitesi ile PMS arasındaki ilişkiye olan etkisi kontrol edildiğinde, yine yaşam kalitesinin PMS üzerinde anlamlı bir yordayıcı

etkisinin olduğu ($\beta=.51$, $F(2,153)=44.517$, $p=.00$) ancak bu ilişkinin zayıfladığı görülmektedir ($b=1.566$, $R^2=.36$, $p=.00$). Bu azalmanın anlamlılığını incelemek amacıyla Sobel z testi yapılmıştır. Sonucunda, yaşam kalitesi ile PMS düzeyi ilişkisi üzerinde, öfke düzeyinin anlamlı bir kısmı mediatör etkisi bulunmuştur ($z=2.1653$, $p=.03$).

Depresyon ile PMS Düzeyleri İlişkisinde Öfkenin Aracı Etkisi

Son olarak, Şekil 3'te gösterildiği üzere, depresyonun düzeyinin yordayan, PMS düzeyinin yordanan olduğu Model-3'te ise yordayıcı ile yordanan arasında anlamlı ve olumlu bir karşılıklı ilişki vardır. Bu ilişkinin, öfke düzeyinin varlığıyla etkileşim içinde olup olmayacağına bakabilmek adına, öfke düzeyinin mediatör olduğu bir model oluşturulmuştur.

Tablo 4'teki mediatör etkinin incelendiği sonuçlara göre, başta depresyon ve PMS ilişkisinde, depresyonun PMS'i ne derece yordadığı incelenmiştir. PMS'in depresyon tarafından anlamlı olarak yordanmakta olduğu ($\beta=.45$, $F(1,154)=41.212$, $p=.00$) ve PMS'in varyansının yaklaşık % 21'inin depresyon tarafından açıklandığı görülmüştür ($b=1.934$, $R^2=.21$, $p=.00$). Sonrasında, yordayıcı olan depresyonun, aracı değişken olan öfkeyi yordama durumuna bakılmış ve öfkenin depresyon tarafından anlamlı bir şekilde tahmin edildiği ($\beta=.25$, $F(1,154)=10.709$, $p=.00$) ve ayrıca, depresyonun yaklaşık %6 oranında öfkenin varyansını açıkladığı bulunmuştur ($b=0.286$, $R^2=.06$, $p=.00$). Son olarak, öfkenin aracı etkisini anlayabilmek için, öfke ve depresyonun birlikte PMS üzerindeki yordayıcı etkisine bakıldığında, sadece öfkenin de PMS'i anlamlı olarak tahmin ettiği ($\beta=.23$, $p=.00$) ve %5 oranında PMS'in varyansını açıkladığı dikkat çekmiştir ($b=0.880$, $R^2\text{change}=.05$, $p=.00$). En önemlisi, modelde öfke aracı etkisi kontrol edildiğinde, depresyonun PMS üzerindeki yordayıcı etkisinin anlamlı bir şekilde devam ettiği ($\beta=.40$, $p=.00$) ancak depresyon ve PMS ilişkisinin gücünün azaldığı görülmüştür ($b=1.682$, $F(2,153)=27.228$, $p=.00$). Bu azalmanın anlamlılığını incelemek amacıyla Sobel z testi yapılmış ve görülmüştür ki; depresyon ile PMS ilişkisi üzerinde, öfkenin anlamlı bir kısmı mediatör etkisi vardır ($z=2.31$, $p=.02$).

Tablo 4. Doğrusal hiyerarşik mediatör analize göre öfkenin depresyon ve PMS üzerindeki aracı etkisi

Model	B	β	p	F	R2	ΔR^2
Depresyon	1.934	0.459	0.000	41.212*	0.211	0.211
Depresyon	1.682	0.400	0.000	27.228*	0.262	0.051
Öfke	0.880	0.234	0.001			

* $p < .01$. B: unstandardised regression coefficient. β : standardised regression coefficient. p: p value. F: F statistic. R^2 : R Squared. ΔR^2 : Delta R Squared

Tartışma

Araştırmanın temel amacı, adet görmeye birlikte özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan PMS'nin yaşam kalitesi, depresyon ve öfke gibi ruh sağlığı değişkenleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu ilişkinin araştırmaya konu edilmesinin sebebi ise kişinin ruh sağlığı ile bağlantılı olan yaşam kalitesi (Lutsky ve ark. 2004, Pınar ve ark. 2011, Kırcan ve ark. 2012, Delara ve ark. 2012, Arıöz ve Ege 2013, Şahin ve ark. 2014, Göker ve ark. 2015, Işık ve ark. 2016, Uran ve ark. 2017, Arslantaş ve ark. 2018), depresyon (Gözüm ve ark. 1996, Erci ve ark. 1999, Danacı ve ark. 2001, Akdeniz ve ark. 2002, Korkmaz ve ark. 2005, Yücel ve ark. 2009) öfke (Pleog 1987, Smith ve Thomas 1996, Öztürk Can ve ark. 2015) ile PMS düzeyleri arasındaki ilişkinin her birini ayrı ayrı değerlendiren çalışmalar literatürde oldukça rastlanmasına karşın, söz konusu çalışmaların ruh sağlığı

deđiřkenlerinin birbirleriyle olan iliřkilerini ve s3z konusu iliřkilerin PMS 3zerinde nasıl bir etki yarattığını analiz s3reçlerine eklememeleridir.

Diđer yandan, yordayıcı olarak ruh sađlıđı deđiřkenlerinin, yordanan olarak da PMS'in belirlendiđi bu arařtırmada ruh sađlıđı deđiřkenlerinin aracı etkisinin deđerlendirilmesindeki neden, literat3rdeki arařtırmalarda yer aldıđı řekilde (G3z3m ve ark. 1996, Smith ve Thomas 1996, Danacı ve ark. 2001, Y3cel ve ark. 2009, Kırca ve ark. 2012, Akyol ve ark. 2013, Arı3z ve ark. 2013, řahin ve ark. 2014, 3zt3rk Can ve ark. 2015), PMS'nin ruh sađlıđı problemlerine sebep olduđu y3n3ndeki fikrin aksine odaklanılarak, aslında ruh sađlıđı problemlerinin PMS'ye sebep olabileceđi y3n3ndeki fikrin savunulmasıdır. 3rneđin, Akdeniz ve arkadařlarının 3alıřmasında (2002), depresyon tanısı almıř ve depresyonu olmayan 15-18 yařlarındaki ge4n4 kızların adet 3ncesi d3nemde yařadıkları belirtiler deđerlendirilmiř ve depresyonu tanısı almıř kızların PMS d3zeylerinin, depresyonu olmayan ge4n4 kızların PMS d3zeylerinden anlamlı bir fark g3sterdiđi bulunmuřtur. Kısacası, bu 3alıřmada PMS d3zeylerinden kaynaklı olan ruh sađlıđı deđiřkenlerinin d3zeylerini incelemek deđil de, Akdeniz ve arkadařlarının arařtırmasında olduđu gibi, ruh sađlıđı deđiřkenlerinin varlıđının PMS 3zerindeki etkisini incelemek ama4lanmıřtır. T3m bu veriler deđerlendirildiđinde, bu 3alıřmanın amacı ruh sađlıđı deđiřkenlerinin birbirleriyle olan iliřkilerine odaklanarak, s3z konusu deđiřkenler arası etkileřimlerin PMS 3zerinde nasıl bir deđiřim yarattığını inceleyerek, olası iliřkilerde ruh sađlıđı deđiřkenleri arasındaki aracı etki olasılıklarını aydınlatmaktır.

Analizlere ilk olarak yařam kalitesi, depresyon ve 3fke gibi ruh sađlıđı deđiřkenleri ile PMS arasındaki iliřkilerin ve ruh sađlıđı deđiřkenlerinin birbirleri ile olan iliřkilerinin boyutları ve anlamlılıđı incelenerek bařlanmıřtır ve arařtırmanın ilk hipotezi bu iliřkiler 3zerine kurulmuřtur. Pearson korelasyon analizi kullanılarak, PMS ile yařam kalitesi, depresyon ve 3fke d3zeyleri arasındaki iliřkilerin incelendiđi bulgulara g3re, PMS d3zeyi artıř g3sterdik4ce yařam kalitesi d3zeyinin bu durumdan olumsuz etkilenerek d3ř3ře ge4tiđi g3r3lm3řt3r. Ek olarak, PMS d3zeyi arttıkkça depresyon ve 3fke d3zeyleri de artmıř ve PMS ile pozitif y3n3l3 ve anlamlı bir etkileřim g3stermiřtir. Diđer yandan, ruh sađlıđı deđiřkenlerinin birbirleri ile olan iliřkilerinin incelendiđi analiz adımımda, Pearson korelasyon analizi kullanılmıřtır. Sonu4lara g3re, yařam kalitesi olumsuz y3nde ilerleyip d3ř3ře ge4tik4ce depresyon ve 3fkeyi d3zeyi artıř g3stermiřtir. Ayrıca, depresyon d3zeyi ne kadar y3ksek olursa 3fke d3zeyi de o kadar y3ksek seyretmiřtir.

Literat3rde, PMS ile yařam kalitesi (Lutsky ve ark. 2004, Pınar ve ark. 2011, Kırca ve ark. 2012, Delara ve ark. 2012, Arı3z ve Ege 2013, řahin ve ark. 2014, G3ker ve ark. 2015, Iřık ve ark. 2016, Uran ve ark. 2017), depresyon (G3z3m ve ark. 1996, Erci ve ark. 1999, Danacı ve ark. 2001, Akdeniz ve ark. 2002, Korkmaz ve ark. 2005, Y3cel ve ark. 2009) ve 3fke d3zeylerinin (Smith ve Thomas 1996, Akyol ve ark. 2013, 3zt3rk Can ve ark. 2015) iliřkisini inceleyen bir4ok arařtırmaya rastlanmıřtır. S3z konusu 3alıřmaların 3alıřmamızla uyumlu sonu4lar g3sterdiđi g3r3lm3ř ve yařam kalitesi, depresyon ve 3fke d3zeylerinin PMS ile anlamlı bir bađıntıya sahip olduđu sonucunu elde etmiřlerdir.

T3m bunların ıřıđında, 3alıřmalarda ruh sađlıđı deđiřkenleri ile PMS arasındaki iliřkiye odaklanılırken, PMS'in mi ruh sađlıđı deđiřkenlerini yordadıđı yoksa ruh sađlıđı deđiřkenlerinin mi PMS'i yordadıđına yeterince a4ıklık getirilmediđi dikkat 3ekmektedir (Pleog 1987, Smith ve Thomas 1996, Akdeniz ve ark. 2002, Y3cel ve ark. 2009,

Kircan ve ark. 2012, Şahin ve ark. 2014, Öztürk Can ve ark. 2015). Dolayısıyla incelenen ilişkilerin anlamlılığında yola çıkarak, çalışmanın gelecek çalışmalara katkısı olaçağının düşünüldüğü ve literatürde yer almayan bahsi geçen konu üzerine ikinci hipotez oluşturulmuştur.

Bu hipoteze göre, ruh sağlığı değişkenleri olan yaşam kalitesi, depresyon ve öfke düzeyleri ile adet öncesi gerginlik sendromu arasındaki ilişkide yine ruh sağlığı değişkenlerinin birbirleriyle olan anlamlı ilişkileri de göz önünde bulundurularak, her bir değişkenin bir diğeri için mediatör (aracı) görevi üstleneceği düşünülmüştür. Söz konusu aracı etkileri incelemek adına, Baron ve Kenny'nin mediatör modeli adımları takip edilmiştir.

Yaşam kalitesi ile PMS arasındaki ilişkiye odaklanılan ilk modelde, depresyonun olası aracı etkisi incelenmek amacıyla öncelikle, yaşam kalitesi ile PMS arasındaki ilişkinin gücüne odaklanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, depresyonun aracı etkisi kontrol edildiğinde, yordayıcı ve yordanan değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığını kaybetmediği ancak söz konusu ilişki gücünün zayıfladığı görülmüştür. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde ise depresyonun yaşam kalitesi ve PMS arasındaki ilişkide tam bir mediatör etkiye sahip olmasa da kısmi bir mediatör etkiye sahip olabileceği yönünde bulgular ortaya çıkmıştır. Bu modele dair yapılan analiz son adımında ise depresyonun olası kısmi mediatör etkisinin anlamlılığını test etmek amacıyla Sobel z testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar yaşam kalitesinin, PMS üzerindeki yordayıcı etkisinde depresyonun anlamlı ve kısmi bir mediatör (aracı) etkisinin olduğunu göstermiştir.

Öfke düzeyinin, yaşam kalitesi ile PMS düzeylerinin ilişkisi üzerindeki olası aracı etkisinin üzerinde durulduğu ikinci mediatör etki modelinde, yine başlangıçta yaşam kalitesi ile PMS düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öfkenin yaşam kalitesi ile PMS düzeyi ilişkisindeki olası aracı etkisi kontrol edildiğinde, ilişkinin anlamlılığını koruduğu fakat zayıfladığı bulunmuştur. Sonuçlar ışığında, öfke düzeyinin, yaşam kalitesi ve PMS düzeyleri ilişkisi üzerinde kısmi bir aracı etkiye sahip olabileceği anlaşılmıştır. Son olarak, öfkenin kısmi aracı etkisinin anlamlılığını analiz etmek amacıyla Sobel z testi uygulanmış ve öfke düzeyinin yaşam kalitesi ve PMS ilişkisinde anlamlı bir mediatör (aracı) etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Depresyon ve PMS arasındaki ilişki üzerinde öfke düzeyinin olası aracı etkisinin incelendiği son modelde ise ilk olarak, depresyon ve PMS düzeylerinin ilişkisinin kuvveti değerlendirilmiştir. Varılan sonuçlar ışığında, öfke düzeyinin, depresyon ile PMS düzeyleri arasındaki ilişkiyi etkilemesi kontrol altında tutulduğunda, ilişkinin anlamlılığını yitirmediği ancak depresyon ve PMS arasındaki ilişkinin gücünün düşüş gösterdiği görülmüştür. Bu düşüşün görülmesi, depresyon ve PMS arasındaki ilişkide, öfkenin kısmi bir mediatör (aracı) etkisinin olabileceği anlamına gelmektedir. Bundan yola çıkarak, öfkenin kısmi mediatör etkisinin anlamlılığını test etmek için Sobel Z testi kullanıldığında görülmüştür ki öfkenin kısmi mediatör (aracı) etkisi, depresyon ve PMS ilişkisi üzerinde anlamlıdır.

Literatürde, ruh sağlığı değişkenleri olan yaşam kalitesi, depresyon ve öfkenin, PMS ile olan ilişkisinde yine ruh sağlığı değişkenlerinin mediatör (aracı) etkisinin incelendiği herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Araştırmalar genellikle, PMS varlığının ve düzeyinin, ruh sağlığı değişkenleri olan yaşam kalitesi, depresyon ve öfke üzerindeki etkisini ayrı ayrı incelemiş (Pleog 1987, Smith ve Thomas 1996, Öztürk Can ve ark. 2015), ancak birbirlerinin varlığında PMS ile olan ilişkilerinin nasıl şekille-

neceđine yeterince bakılmamıştır. Bu sebeplerle, bu arařtırmada, PMS ile anlamlı iliřki-
sinin bulunduđu ve literatür arařtırmalarına da dahil edilmiř yařam kalitesi, depresyon
ve öfke gibi ruh sađlıđı deđiřkenlerinin aracı etkisi, PMS ile olan iliřkileri üzerinden
kapsamlı bir řekilde incelenmiř ve bulguları arařtırmaya dahil edilmiřtir.

Diđer yandan, alıřmamız PMS dzeyi ile ruh sađlıđı deđiřkenlerinin birbiri ve
kendileri arasındaki iliřkilerini incelerken, alt boyutlar yerine toplam skorları deđerlen-
dirmesi ve hesaplaması bakımından farklılařmaktadır (Smith ve Thomas 1996, Erci ve
ark. 1999, Danacı ve ark. 2001, Akdeniz ve ark. 2002, Pınar ve ark. 2011, Kırcan ve
ark. 2012, Delara ve ark. 2012, Arıöz ve Ege 2013, řahin ve ark. 2014, Gker ve ark.
2015, Öztürk Can ve ark. 2015, Iřık ve ark. 2016, Uran ve ark. 2017). Ancak nceki
arařtırmalar ođunlukla PMS ve yařam kalitesi ve fke gibi alt dzeyleri olan ruh sađlıđı
deđiřkenlerini gruplandırılarak (var-yok, dřk-orta-řiddetli gibi) veya lek toplam
puanları üzerinden deđil de lek alt skorları üzerinden incelenmeyi tercih etmiřlerdir.
Bylelikle, ruh sađlıđı ve PMS dzeylerinin olası iliřkileri incelendiđinde, anlamlı bir
iliřki olup olmadıđının yanı sıra zellikle hangi alt boyutlar arasında anlamlı bir deđiřim
yařandđı anlařılabilmis ve o dođrultuda sonular deđerlendirilebilmiřtir. Bu yzden
leklerimizin alt boyutları daha geniř aplı bir bilgiye sahip olmak iin gelecek alıř-
malara dahil edilebilir.

Sonuç olarak, PMS belirtileri olan ve tedavi arayışında olan gen kızlarda veya ka-
dınlarda, ilk olarak yařam kalitelerinin deđerlendirilmesinin ve gerekli aralarla fke ve
depresyon dzeylerinin lmlenerek anlařılmasının faydalı olacađı dřnlmektedir.
nk ruh sađlıđı deđiřkenleri PMS iin srdrc bir faktr zelliđi tařımaktadır.
Dolayısıyla, ruh sađlıđı deđiřkenlerinin dzeyleri kontrol altına alınmadıka PMS tedavi
srecini sekteye uđratması ve PMS belirtilerin yatıřtırılmaması olasıdır. Diđer yandan,
arařtırmamızın bulgularına gre PMS ile yařam kalitesi, depresyon ve fke ruh sađlıđı
deđiřkenlerinin iliřkisine yakından bakıldıđında en gcl ve anlamlı olan korelasyonun
yařam kalitesi ile PMS arasında olduđu grlmřtir. Dolayısıyla, ilerleyen arařtırmalarda
yařam kalitesini etkileyebilecek yařam olaylarının ve davranıřların deđerlendirilmesi
de nem arz etmektedir. Fiziksel ve ruhsal birok alanda etkili olan stresin ise yařam
olaylarında karřılařılan problemler veya karřılanmayan beklentiler sonucu, yařam kalitesi
zerinde bir belirleyici olabileceđi dřnlmektedir (Moksnes ve Haugan 2015) nk
stres ile PMS arasındaki iliřkinin incelendiđi alıřmalardan bařka (Lutsky ve ark. 2004,
Potter ve ark. 2009, Yamamoto ve ark. 2009) stresin aracı etkisinin incelendiđi alıřma-
lar da (Groer ve ark. 1993, Lutsky ve ark. 2004) gzlenmekte ve anlamlı bir etkisinin
olduđu bildirilmektedir (Lee ve Im 2016). Tm bunlarla bađlantılı olarak, gelecek
alıřmalarda kiřilerin yařam kalitesini etkileyebilecek nemli bir faktr olarak, zellikle
stresin varlıđının ve boyutunun gz ardı edilmemesinin nemli olacađı dřnlmis ve
PMS ile yařam kalitesi zerinde stresin olası bir aracı etkisinin de olabileceđine kanaat
getirilmiřtir.

Kaynaklar

- Akdeniz FT, Korkmaz S, Tamar M, Beker B (2002) Depresyonu olan ve olmayan gen kızlar ve annelerindeki adet ncesi
yakınmaların karřılařtırılması. ocuk ve Genlik Ruh Sađlıđı Dergisi, 9(1):16-22.
- American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5). Washington
DC, American Psychiatric Association.
- Arenliu A, Kelmendi K, Berxulli D (2016) Gender differences in depression symptoms: findings from a population survey in kosovo-
a country in transition. Psychological Thought, 9(2):236-247.

- Ariöz A, Ege E (2013) Premenstrüel sendrom sorunu olan üniversite öğrencilerinde, semptomların kontrolü ve yaşam kalitesinin artırılmasında eğitimin etkinliği. *Genel Tıp Dergisi*, 23(3):63-69.
- Arsılantaş H, Abacıgil F, Çınaklı Ş (2018) Relationship between premenstrual syndrome and basic personality traits: a cross-sectional study. *Sao Paulo Med J*. 136:339-345.
- Baron RM, Kenny DA (1986) The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations. *J Pers Soc Psychol*, 51:1173-1182.
- Beck AT, Steer RA, Garbin MG (1988) Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: twenty-five years of evaluation. *Clin Psychol Rev*, 8:77-100.
- Bosarge PM (2003) Understanding and treating PMS/PMDD. *Nurs Manage*, 5:13-17.
- Choate LH (2014) Adolescent girls in distress: a guide for mental health treatment and prevention. New York, Springer Publishing.
- Danacı AE, Taşkın EO, Koltan SO, Uyar Y (2001) Premenstrüel disforik bozuklukta semptomatolojinin adet döngüsüyle ilişkisi. *Anadolu Psikiyatri Derg*, 2:15-20.
- Delara M, Ghpfraniipour F, Azadfalsh P, Tavafian SS, Kazemnejad A, Montazeri A (2012) Health related quality of life among adolescents with premenstrual disorders: a cross sectional study. *Health Qual Life Outcomes*, 10:1.
- Derman O, Kanbur NO, Tokur T, Kutluk T (2004) Premenstrual syndrome and associated symptoms in adolescent girls. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*, 116:201-206.
- Doğan S, Doğan N, Can H, Alaşehirlioğlu HV (2012) Birinci basamakta premenstrüel sendroma yaklaşım. *Symrna Tıp Dergisi*, 2(Ek1):90-93.
- Erci B, Okanlı A, Kılıç D (1999) Premenstrual sendromun sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve depresyonla ilişkisi. *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 2(2):14-26.
- Evliyaoglu O, Alikashioglu M, Ercan O (2010) Ergenlerde menstrüel döngü bozuklukları. *Türk Pediatri Arşivi Dergisi*, 45:6-12.
- Evren C, Çınar Ö, Güleç H, Çelik S, Evren B (2011) The validity and reliability of the Turkish version of the Buss-Perry's Aggression questionnaire in male substance dependent inpatients. *Dusunen Adam*, 24:283-295.
- Frackiewicz EJ, Shiovitz TM (2001) Evaluation and management of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. *J Am Pharm Assoc*, 41:437-447.
- Frank RT (1931) The hormonal causes of premenstrual tension. *Arch Neurol Psychiatry*, 26:1053-1057.
- Gençdoğan B (2006) Premenstrüel sendrom için yeni bir ölçek. *Türkiye'de Psikiyatri*, 8(2):81-87.
- Göker A, Artunç-Ülkümen B, Akten F, İzik N (2015) Premenstrual syndrome in Turkish medical students and their quality of life. *J Obstet Gynaecol*, 35:275-278.
- Gözüm S, Özer H, Tuncel Ş (1996) Premenstrüel gerilim belirtilerinin sağlıklı genç erişkinlerde görülme derecesi ve bunların anksiyete ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. *Dusunen Adam*, 9(4):40-46.
- Groer M, Carr J, Younger MS (1993) Relationships between self-reported symptoms of infection, menstrual-cycle-related distress, and cycle phase. *J Behav Med*, 19:13-19.
- Hamburg DA, Takanishi R (1989) Preparing for life: the critical transition of adolescence. *American Psychologist*, 44:825-827.
- Hisli N (1988) Beck Depresyon Envanteri'nin geçerliği üzerine bir çalışma. *Türk Psikoloji Dergisi*, 6(22):118-126.
- Işık H, Ergöl Ş, Aynioğlu Ö, Şahbaz A, Kuzu A, Uzun M (2016) Premenstrual syndrome and life quality in Turkish health science students. *Turk J Med Sci*, 46:695-701.
- Kırcan N, Ergin F, Adana F, Arslantaş H (2012) Hemşirelik öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 13(1):19-25.
- Korkmaz Çetin S, Akdeniz İF, Tamar M (2005) Depresif bozukluk tanımlı genç kızlarda adet öncesi belirti dağılımı ve şiddeti. *Anadolu Psikiyatri Derg*, 6:145-153.
- Lee Y, Im E (2016) Stress and premenstrual symptoms in reproductive-aged women. *Health Care Women Int*, 37:646-670.
- Logue CM, Moss RH (1986) Premenstrual symptoms: prevalence and risk factors. *Psychosom Med*, 48:388-414.
- Lustyk MKB, Gerrish WG, Shaver S, Keys SL (2009) Cognitive-behavioral therapy for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a systematic review. *Arch Womens Ment Health*, 12:85-96.
- Memik NC, Ağaoğlu B, Coşkun A, Üneri ÖŞ, Karakaya I (2007) Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeği'nin 13-18 yaş ergen formu'nun geçerlik ve güvenilirliği. *Türk Psikiyatri Derg*, 18:353-363.
- Moksnes UK, Haugan G (2015) Stressor experience negatively affects life satisfaction in adolescents: The positive role of sense of coherence. *Qual Life Res*, 24:2473-2481.
- Öncel S, Pınar A (2006) Premenstrual sendromda tanı, tedavi ve hemşirelik yaklaşımı. *Sendrom (Hemşirelik)*, 18(9):86-91.
- Öztürk Can H, Baykal Akmeşe Z, Durmuş B (2015) Sınıf öğretmenlerinde premenstrüel sendrom görülme durumu ile sürekli öfke ve öfke tarzları arasındaki ilişki. *NWSA-Life Sciences*, 10(1):1-13.
- Pınar G, Çolak M, Öksüz E (2011) Premenstrual syndrome in Turkish college students and its effects on life quality. *Sex Reprod*

- Healthc, 2:21-27.
- Ploeg HM (1987) Emotional states and the premenstrual syndrome. *Pers Individ Dif*, 8:95-100.
- Potter J, Bouyer J, Trussell J, Moreau C (2009) Premenstrual syndrome prevalence and fluctuation over time: Results from a French population-based survey. *J Womens Health*, 18:31-39.
- Ridgeway CL, Smith-Lovin L (1999) The gender system and interaction. *Annu Rev Sociol*, 25:191-216.
- Schmelzer K, Hiller W, Ditzgen B, Weise C, Kleinstauber M, Andersson G (2015) Clinical profiles of premenstrual experiences among women having premenstrual syndrome (PMS): affective changes predominate and relate to social and occupational functioning. *Health Care Women Int*, 36:1104-1123.
- Smith H, Thomas SP (1996) Anger and locus of control in young women with and without premenstrual syndrome. *Issues Ment Health Nurs*, 17:289-305.
- Sloan MM (2012) Controlling anger and happiness at work: an examination of gender differences. *Gen Work Organ*, 19:370-391.
- Spielberger CD (1988) *Professional Manual for The State-Trait Anger Expression Inventory*. Odessa FL, Psychological Assessment Resources.
- Şahin S, zdemir K, nsal A (2014) Evaluation of premenstrual syndrome and quality of life in university students. *J Pak Med Assoc*, 64:915-922.
- Tanrıverdi G, Selçuk E, Okanlı A (2010) niversite ğrencilerinde premenstrual sendrom prevalansı. *Anadolu Hemşirelik ve Sađlık Bilimleri Dergisi*, 13:52-57.
- Tuđlu C (2013) Kadın-erkek beyni arasındaki farklar ve psikoterapiye yansımaları. *Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics*, 6(1):68-74.
- Ugarrizza DN, Klinger S, O'Brien S (1998) Premenstrual syndrome: diagnosis and treatment. *Nurse Pract*, 23(9):40-56.
- Uran P, Yrmez E, Aysev A, Kılıç BG (2017) Premenstrual syndrome health-related quality of life and psychiatric comorbidity in a clinical adolescent sample: a cross-sectional study. *Int J Psychiatry Clin Pract*, 21:36-40.
- Varni JW, Seid M, Rode CA (1999) The PedsQL: measurement model for the Pediatric Quality of Life Inventory. *Medical Care*, 37:126-139.
- West C, Zimmerman DH (1987) Doing gender. *Gen Soc*, 1:125-151.
- Yamamoto K, Okazaki A, Sakamoto Y, Funatsu M (2009) The relationship between premenstrual symptoms, menstrual pain, irregular menstrual cycles, and psychosocial stress among Japanese college students. *J Physiol Anthropol*, 28:129-136.
- Ycel UT, Bilge AT, Oran NT, Ersoy MT, Gençdođan BT, zveren T (2009) Adolesanlarda premenstruel sendrom yaygınlığı ve depresyon riski arasındaki iliřki. *Anadolu Psikiyatri Derg*, 10:55-61.

Yazarların Katkıları: Tm yazarlar, her bir yazarın alıřmaya nemli bir bilimsel katkı sađladığını ve makalenin hazırlanmasında veya gzden geirilmesinde yardımcı olduğunu kabul etmişlerdir.

Etik Onay: alıřma Yerel Etik Kurul tarafından onaylanmıştır. Tm katılımcılardan yazılı aydınlatılmış onam alınmıştır.

Danışman Deđerlendirmesi: Dıř bađımsız

ıkar atışması: Yazarlar ıkar atışması bildirmemiřtir.

Finansal Destek: Yazarlar bu alıřma iin finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Authors Contributions: All authors attest that each author has made an important scientific contribution to the study and has assisted with the drafting or revising of the manuscript.

Ethical Approval: The study was approved by the Local Ethics Committee. Written informed consent was obtained from all participants.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.
